庫全書

子部

欽定四庫

太平惠民和劑局方卷二

詳校官太醫院醫士臣趙正池 編修臣倉聖脈覆勘

校對官主事 總校官編修 謄録監生 正左販者 中原文極行臣王縣緒 次至四事全時 一日 一日 太平惠民和翻句方 風爽頭痛嘔吐寒熱並治之 報頭痛項强壯熱惡寒身體煩 甘草 羌活盖 撰

或過經未解或潮熱不除及瘥後勞復發熱疼痛婦 痛 小柴胡湯治傷寒温熱病身熱惡風頸項强急胸牆脇 嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘澁 風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作 分去津溫服不拘時寒多則熱服熱多則溫服 **石為細末毎服二銭水** 见人 獨 妙黄 水浸 凿 去 色 各穰 梗 等剉 おこ **小**製 **盛生薑薄荷名少許前** 柴胡 洗 焅 占

四肢的急煩疼面赤咽乾嘔逆煩渴 7. J. L. J. J. J. 量大小加減 橋散治傷寒及時行疫癘頭痛項强壯執惡 破同煎七分去滓稍熱服不拘時小兒分作二 右為意末每服三大錢水盛半生薑一片聚 風頭痛煩熱並宜服之 柴胡去蘆 甘草炙雨 半斤 半夏乳二兩 黄芩 太平惠民和副写方 次焙 半 濫 去 一服更 箇學

金分匹母全書 亦得煎七分稍熱服不拘時相次再服衣被益汗出 右為簏末毎服二錢水一盞入林檎糁十數斤新者 甘草炙 石膏和半 川大黄 前胡去蘆春香茶 山梔子皮 瞿麥 麻黄節 蒼木 木通 **哈歸去**蘆 肉桂去蔗 乾葛 川鳥頭炮裂去 川芎 两 皮

くうう! 乾心胸煩滿寒熱往來疾實效嗽涕無稠粉 柴胡石膏散治時行瘟疫此熱惡風頭痛體疼鼻塞咽 時候 右為箴末每服二錢水一 鸵葛 桑白皮 石膏 稍熱服小兒分作 前胡云 柴胡五十 雨荆芥穗去土三 黄本七两半 凿 **盏生薑三片淡豉十粒前** 升麻二+ 赤芍藥 服量大小加減不 五两 क्ष 拘

微喘又治溢飲身體疼重及效逆倚息不得安卧或因 金定匹库全書 形寒飲冷內傷肺經咳嗽喘急嘔吐涎沫並宜服之 小青龍湯治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱,欬嗽 麻黃湯治傷寒頭痛發熱惡風骨節痛喘滿無汗 右為麓散入杏仁膏今勺每服三錢水一盛半煎八 **必去津温服汗出為度若病自汗者不可服不拘時** 肉桂三馬皮 三两 甘草多 杏仁 炒七週兩 研 去皮头

感表裏未辨或外熱內寒或外寒內熱頭項腰背拘急 疼痛發熱惡寒肢節疼重嘔逆喘欬鼻塞身重及食飲 聖散子治傷寒時行疫癘風溫濕溫一切不問陰陽两 蓋去滓食後溫服 右為養散入半夏令匀每服三銭水一盏半煎至 乾薑炮 麻黄品根 五味子 甘草州 半夏汤洗净 お 樂 妙 二两半 肉桂去魚皮 細辛品 楽

次記日本

太平惠民和副局方

生冷傷在胃脘胸膈滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆 冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利並宜服之 五クロ人と言 防風蓋 枳殼去粮 麻黄玉根 芍薬 猪苓 草豆茂士母石菖蒲 柴胡蘆 霍香去土及吳茱萸 獨活產 蒼术 厚朴蓋註炎藁本 茯苓去黑 附子皮癖去 澤瀉 髙良薑 去 ł 人法洗

久己日日八十 悶頭目昏痛有背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進 及婦人血氣不調心腹撮痛經候不匀或閉不通並宜 痛胸膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞 五積散調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹 拘時取遍身微汗即愈時氣不和空服飲之辟邪疫 右為養散每服四錢水盛半煎取一盏去滓熱服不 甘草美剛 薑汁製 湯洗七次 細辛 太平惠民和朝局方 聿 吴白术 各半 五

服之 金牙口月台書 慢火炒令色轉攤冷次入肉桂枳殼末令勺每服三 右除肉桂枳殼外別為魔木外一十三味同為魔末 乾薑四兩 肉桂去煮 甘草炙 陳橘皮姑 白芍藥 白芷春五 茯苓去 枳殼去旗 桔梗去蘆春煮 川芎 K 厚朴皮意 當歸法蓝 半夏七次 麻黄各六雨 一二十四兩八净洗去皮 去根節

人こりいん 同煎並不拘時候 體的急或手足厥冷即入炒菜英七粒鹽少許同煎 **葱白三寸政七粒同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢** 如寒熱不調致嗽喘淌入聚煎婦人産難入酷一合 氣奔衝心腸臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄痢清穀及 同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風發熱項背强痛入 **步癖癥瘕膀胱小腸氣痛即入煨生薑三片鹽少許** 太平應民和顧司方

疼及瘡疹已發及未發疑貳之問並宜服之 升麻葛根湯治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱時 金好四母全書 **歳數加減與服** 热服不拘時候日二三服以病身清凉為度小兒量 石為魔末每服三錢水一盛半煎取一 解肌湯治傷寒瘟 甘草 升麻 十天两各 葛根 表 白芍薬 一中蓋去津稍

とうことに **肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利然嗽喘湍涕聽稠粘及** 寒肢體拘急骨節頻疼腰脊强痛胸腸煩悶 金沸草散治風化疾除頭目昏痛頭項强急往來寒熱 去滓稍热服不拘時候取汗出為度 右為麄末毎服三錢水一盞半棗子一枚煎至八分 ち 楽 葛根 兩四 **壯热惡風** 甘草六两 麻黄三根 太平惠民和劇局方 商黄芩 肉柱。 去龍皮 щ Ł

秘遊腹溝脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五 **剑**定匹庫全書 大柴胡湯治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱往來大便 解利 煎八分去滓溫服不拘時有寒邪則汗出如風盛則 右為麓末毎服三錢水一盛半生薑三片棗一枚同 荆芥穗 旋覆花多二 藥和 柳四 F. 前胡蘆 甘草炒 卷二 麻黄蒜 半夏湯洗七次 蓝汁 根

腑實脉有力者可服之 六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱無臟 傷寒內熱果實若身體疼痛是表證未解不可服之 **片聚一枚煎至一中盛去滓温服食後臨卧此藥** 右為麓末入半夏令勺每服三錢水一盛半生薑五 松實去旗数 柴胡去蓝 半斤 半夏湯洗七次切作片 黄芩 子焙乾二兩 赤芍藥和三

欽定四庫全書 便堅硬小便自利及風虚頭目財重甚者不知食味 术附湯治風濕相搏身體煩疼不能轉倒不嘔不渴 片聚一枚同煎一盏去洋溫服食前 中助陽氣止自汗 右為意未入附子令句每服三錢水 甘草到炒 附子 **寒二** 及平惠民和· **功** 一两 炮去皮 臍 利品方 ЖU 身盡重四肢少 盛半生薑五

薑,附湯治傷寒已經轉下又會發汗內外俱虚邪氣未 解表證不見身無大熱畫日煩躁不得脈腫夜即安靜 客搏 腰脚浮腫上輕下重不能 屈伸 力關節頻疼時自汗出酒浙惡風不欲去永及治風冷 至一盏稍熱服不拘時蓋覆溫即令微汗瘥 右為魔末每服三錢水一盛半生蓝三片聚 白术 防巴 あ 黄耆 雨五 甘草成二 一箇前

悶或得汗已解內無津液虛贏少氣胸中煩満氣逆欲 欽定四庫全書 吐及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼頭不 竹葉石膏湯治傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩 水心腹冷痛霍亂轉筋一切虚寒並皆治之 不嘔不渴脉使沉微者宜服之又治暴中風冷久積痰 前 右合匀每服三錢水一盏半煎至一盏去滓溫服食 乾薑八两 附子細切一枚 太平惠民和朝司

脉不緊數即不可汗下宜服此藥 煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴 五苓散治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾 煎米熟去米温服不拘時 生薑各五六片煎至一盏半去滓入粳米百餘粒再 右為魔末入半夏令勺每服三錢水二盛入青竹葉 甘草派二 半页 |湯洗七次 三两半 麥門冬日心五 半

金定四庫全書 不止又治霍亂吐利躁渴引飲 調服小兒加白术末少許如發虛熱加綿黃耆人象 陳萬湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦可用水 湯有汗出即愈 右為細末每服二錢熱湯調下不拘時服記多飲熱 澤寫二十 白术 十五兩內桂去魔皮 五雨 猪苓皮去 又治疾熱在裏身發黃疸濃煎茵 为平應日本曆层月

證悉具者未可攻表先宜服此樂助陽救稟 或漩或利或汗出過多脉微欲絕腹痛脹淌手足逆冷 **氣虚裏有寒雖更覺頭痛體疼發熱惡寒四肢拘急表** 四逆湯治傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發小便 **盏半煎至一中盏去洋温服不拘時常服消暑氣办** 右以甘草乾薑為意末入附子令勺每服三錢水 甘草成二 功虚寒厥冷並宜服之凡傷寒有此證候皆由陽 乾豐平 啊 附子降半两

濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調 /順散治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清 右先将廿草用白砂炒及八分黄熟次入乾薑同炒 水穀 隅净後人肉桂一處搖羅為散每服二錢水一 **兮薑裂次入杏仁又同炒候杏仁不作聲為度用** 肉桂去魚皮 甘草里十月乾薑 卷二 医成私露层方 C. T. ... /... 服之又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴 俱熱時時惡風大渴舌上乾躁而煩欲飲水數升者宜 白虎湯治傷寒大汗出後表證已解心胸大煩渴表裏 點亦得 右為細末毎服三錢水一盏半入硬米三十餘粒煎 至一盞去滓溫服小兒量力與之或加人參少許同 煎七分去滓溫服如煩躁并花水調下不拘時沸湯 石膏介洗研知母十兩 甘草鱼两 太平息民和劉易方 1

動戶 四母全書 霍亂吐利轉筋並宜服之 香薷圓治大人小兒傷暑伏熱躁渴瞀悶頭目昏腔胸 膈烦淌嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發 煎亦得食後服此樂立夏後五秋前可服春月及立 秋後并亡血虚家並不可服 乾木瓜 甘草炙剉 白茯神 紫蘇去意 藿香葉 卷二 檀香剉 香薷去土名 ψĐ

て、 「 !! こ!! 歸於三焦傳於脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相 痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐 度或起居不節或露卧濕地或當風取凉而風冷之氣 香薷散治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過 干腸胃虚弱飲食變亂於腸胃之間便致吐利心腹疼 時 右為細末煉蜜和勺圓每一兩作三十圓每服| 至二圓細嚼溫湯下或新汲水化下小兒早圓不拘 太平惠号和副号方

金好四月全書 治 利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或 利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐 四肢逆冷而脉欲絕或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能 中沉冷連喫二服立效不拘時 右麓末毎服三錢水一盞酒一分同煎七分去滓水 **扁豆加黄連四两剉生薑汁同研勺炒黄色名黃連** 香薷去土 白扁豆 厚朴民食黄各半片 活人書方不用白 广

胸膈痞悶嘔喉惡心頭目昏眩口乾煩渴肢體因倦全 不思食或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩躁引飲 枇杷葉散治冒暑伏熱引飲過多脾胃傷冷飲食不化 香薷散 石為細末毎服二錢水一 甘草 麥門冬去心白茅根 各半 兩 F. 机把葉五天陳橘皮去 太平惠民和削仍方 一盏生薑二片煎七分去滓 木瓜 い去麓皮薑 汁炙四 + 柯

僧如應夢人參散治傷寒體熱頭痛風壅痰嗽咯血等 **剑定匹库全害** 疾 通口服如傷寒入淡或同煎熱 右為細末毎服二錢水一盏薑二片棗二箇煎七分 溫服溫水調亦得如煩躁用新汲水調下不拘時 **兒三歲已下可服半錢更量大小加減** 梧梗 參 青皮 白芷 卷二 穰去 白术 乾薑 神效不拘時 各等 外

.... 香蘇散治四時瘟疫傷寒 已寒圓治傷寒積冷臟腑虚弱心腹疠痛脇肋脹淌 後處鬼問富人富人以實告鬼口此老教三方與一富人家其家合施當大疫城中病者時日三服若作細末只服二錢入鹽點服老 額 右為麓末每服三錢水一盏煎七分去滓熱服不拘 甘草 雨 陳皮 1.11 函 香附子炒去 太平惠民和創局方 紫蘇葉る ĽУ · 三 人 曾有 劃 人等就此是

卸兵匹库全書 泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化陽氣暴衰陰氣獨勝手 足厥冷傷寒陰盛神昏脉短四肢怠惰並宜服之 太陽丹治頭疼傷寒感風氣積偏正夾腦一切頭痛每 食前 石為末水煮麵糊圓如梧桐子大每二十圓米飲下 並撥各四 髙良薑 ir 7.1 乾薑炮各 風壅 赛 六六斤 | 痰战咽膈不利亦宜服之 肉桂去魚

瘌 くこりうべい 和解散治四時傷寒頭痛增寒此 右為細末蜜同麵糊為圓每兩作一十八粒硃砂為 甘草作 甘草炙各 川島大者炮川苔 1.各半 一大大 藻本 研細 腦子 太平惠民和劇局方 升矣 陳皮去白 枯梗 白芷 熟煩躁自汗 兩 各 汁欬嗽吐

金好四月至書 飲食 肋膨脹心下堅痞吐利嘔逆酸水欬逆怠惰嗜卧不思 正氣散治傷寒陰症憎寒惡風正氣逐冷胸膈噎塞脇 七分不拘時熱服 石為魔未每服三錢水一盛半生薑三片聚二枚煎 甘草哉 白术 同 為 微 妙七 餅 半夏 陳皮 苍二 厚利末生薑 霍香去根各 同半夏各三 CONTRACTOR AND ADDRESS OF 四 屷 兩 研 為 KH1

大のとりあるいます 力脾元氣虚不思飲食霍亂吐寫四肢冷麻無解二毒 十華散治丈夫五勞七傷渾身疼痛四股拘急腰膝無 常服順氣電中群除瘟疫 寒療胸氣流注腫痛行步不得及虚勞等疾並治之 分食前稍熱服又治久患瘧疾腸氣心痛日進三服 右為細末毎服二銭生薑三片聚一枚水一盏煎七 甘草 五加皮 温谷十 陳皮は 太平忠民和朝局方 附子此雨 乳造炮 +

少力常服壮筋骨股體輕健進食 到散治男子婦人五勞七傷感冷冒寒氣弱體虚多樣 金月四月百十 右為細末毎服二錢水 不拘時熱鹽酒調服亦得 桔梗 乾葛 天仙藤 養术人去 妙 内柱上於 青萬子炒 荆芥穗 农二 銭 一盏薑二片聚一枚煎六分 函 前胡生薑 綿黃者去蘆

シーラー シーマ 至七分去滓温服併两滓作 右為愈末每服三大錢水一盏半入生薑烏梅聚煎 厚朴畫鬼 藁本 陳橘皮 麻黄品根 白芍薬 半夏為魚水川羌活 苗香炒 甘草炒 桔梗 川芎各二 柴胡 太平惠民和副司方 斤半 白芷炒 黄耆 香附子炒 内柱去盆及 秦光 一服煎 1

消暑圆治傷暑發熱頭熱 桂苓圆大解暑毒 多反四月全書 右為細末以生薑汁作薄糊為圓如梧桐子大每服 水或熟水嚼下化下亦得 右為細末煉蜜為圓每两作八圓每服一圓用新汲 五十粒水下 肉桂去魚皮茯苓去皮各 麦乾 養乾 茯苓去 易簡方云此藥合時須用好醋煎煮 甘草 生用各 ĴΓ

省者 口乾焦神思春沉在言語語如見鬼神及瘴瘧煩悶 辰砂五苓散治傷寒表裏未解頭痛於熱心胸鬱問唇 岩痰飲停節並用薑湯嚥下入夏之後不可關此 為患藥下即甦傷暑於熱頭疼用之尤驗夏月常服 半夏薑汁作糊無見生水臻至修合用之神效中暑 止渴利便雖多飲水亦不為患應是暑藥皆不及此 1) 木猪苓皮 白木 太平惠民和制昌方 洗去 澤寫此

黏疾涎壅威氣急湍悶並宜服之 疼四肢倦怠行歩喘乏及塞壅咳嗽鼻塞聲重涕睡桐 消風百解散治四時傷寒頭疼項强壯熱惡寒身體煩 金灰匹厚全書 咬牙上擔欲為驚狀每服半錢溫熟水調下 小便赤漩用新汲水調下小兒五心煩熱焦躁多哭 右為細末每服二錢沸湯點服不拘時如中暑發渴 赤状苓皮 辰砂研各十 決去 雨 肉桂七成 白芷

飲主四東全 胸膈痞滿倦怠少力霍亂轉筋吐瀉不止胎前産後並宜 痛身體沉重頭目旋暈看背拘急手足冷麻半身不遂 口眼唱斜痰涎不利言語寒澀或脾胃不和心腹刺痛 人參順氣散治丈夫婦人風虛氣弱榮衛不和肢節疼 煎七分不拘時溫服或用茶酒調下仍欲發散風邪 右為末毎服二大錢水一大盛薑三片烏梅|箇同 八連鬚葱白三寸同煎 蒼朮 麻黄山南 甘草成二 太平忠民和劇局方

服之 Í 白煎服 煎八分不拘時傷風感冷頭疼腰重咳嗽鼻塞加葱 右為末毎服二錢水一盛薑三片聚一枚蓮 甘草炙 厚朴蓝汁製岩梗盖 川芎 蘆 乾萬去歲皮 白芷春四 白术盖 乾薑 陳皮は 麻黄菇

次之四重人与 四 吐小便不利臟腑不調惡心頭暈並皆治之 效 保真湯治四時傷寒不問陰陽二證纔覺疾作急服立 解暑三白散治胃暑伏熱引飲過多陰陽氣逆霍亂嘔 煎七分去滓熱服不拘時神效不可具述 右吹咀為瓮末毎服三銭水一盞半生薑三片 蒼木 川芎 /剉麩炒 十六两 去蘆谷甘草 太平惠民和劇母子 **炒** 兩 Ŧ 6

藥太多致煩躁者並宜服之 縮脾飲解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱 右吹咀每服四錢水 右吹咀每服半兩重水一盡薑五片燈心十並煎入 **外去滓服不拘時** 烏梅肉 白扁豆好及乾葛到各 白茯苓 縮砂 白术 卷二 仁 大碗煎八分去滓以水沉冷 甘草四 草果火去 澤瀉各等 千段雨

乾心胸煩湍寒熱往來痰盛咳嗽涕點稠黏 柴胡升麻湯治時行瘟疫北热惡風頭痛體疼鼻塞咽 右吹咀每服三大錢水一盏半生薑三片政十餘粒 服以解煩或欲熱欲溫任意服代熟水飲極妙 同煎一盏去滓稍熱服不拘時小兒更量大小加減 柴胡蘆 荆芥日 世十赤芍薬 桑白皮 石膏煅 黄丛 去次各 六兩半 乾葛る十 前胡羞 升麻 兩五

欽定四庫全書 冒古人不敢輕發汗者止由麻黄能開凑理用或不能 除不必服樂但節其飲食適其寒溫自然平治大抵感 調之或尚頭疼則濃煎生薑葱白湯下聖餅子三證既 微汗減然俟汗乾則徐徐去被謹避外風自然解散若 用厚被益睡連進此數服以薄粥湯之類佐之令四肢 元有汗亦須溫潤以和解之或有餘熱以參蘇飲<u></u>款 疼肢體拘急不問風寒二盜及內外之殊均可治療先 一參養胃湯治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏 卷.

得宜則導泄真氣因而致虛變生他證此樂乃平和之 四時瘟疫常服尤住 右為攻咀毎服四錢水一盛半薑七片烏梅一箇煎 至七分去滓熱服無治飲食傷脾發為咳瘧或脾胃 藿香葉洗 二能溫中解表而已不致妄擾也無能辟山風瘴氣 厚 參去蘆各甘草美二 朴益治製為术 草果煨 八米泔沒半夏 橘紅七酸 茯苓去黑 半

欽定四庫全書 雖有前胡乾萬但能解肌耳既有枳殼橘紅輩自能宽 宜服之若因感冒發熱亦如服養胃湯法以被益即連 進數服微汗即愈尚有餘熱更宜徐徐服之自然平治 參蘇飲治感冒於熱頭爽或因疾飲凝結軍以為熱並 因痰飲發熱但連日頻進此樂以熱退為期不可預止 快膈不致傷脾無大治中脫痞淌嘔逆惡心開胃進 中脫虛寒嘔逆惡心皆可化之或發寒瘧寒痰及惡 寒者並加附子名十味不換金散

飲定四車全書 拘其所因也小兒室女亦宜服之 食無以踰此毋以性凉為疑一 去滓微熱服不拘時易簡方不用木香只十味 右吹咀每服四錢水一盛半薑七片聚一筒煎六分 甘草 紫蘇用 陳皮 人参蓝 去 白 乾葛洗 木香多半 **水**般 去 種 茯苓三次各 太平惠民和劇句子 廟 前胡品 桔梗 一切發熱昏能取效不必 半夏 去 省 声四

對金飲子治諸疾無不愈者常服固元陽益氣健腿 傷風鼻塞聲重咳嗽頭昏並治之 神术散治四時瘟疫頭痛項强發熱增寒身體疼痛及 右為細末每服三錢水一盏生薑三片葱白三寸煎 七分溫服不拘時如覺傷風鼻塞用葱茶調下 藁本上 養木西 香白芷 1 川芎 羌活蓝 甘草炙各 細辛其 去上 一两

有效 食和胃祛痰自然紫衛調暢寒暑不侵泰四時傷寒極 右為鶯末每服三錢空心水一盏薑二片如茶法煎 甘草六西 陳皮 黄半斤苍术 人去皮 厚朴盖治我

安如未得汗以稀粥投之厚葢衣服取汗立愈五勞 熱加連鬚葱白五莖政三十粒同煎服數劑汗出得 取八分滓再煎兩度服瘟疫時氣二毒傷寒頭痛北

飲定四車全書

太平惠民和劉局方

荆芥穗腿膝冷疼加牛膝浑身拘急及虚壅加地骨 加丁香食傷加高良薑四時泄瀉加肉豆蔻風疾加 **氣腫潘加桑白皮煎婦人赤白帶下加黃者煎酒傷** 藥不問老少胎前產後五勞七傷六極八邪耳鳴眼 加萘本霍亂轉筋加楠木皮已上助使止加一銖此 **及腿瘅加兎絲子白痢加呉茱萸赤痢加黃連頭風** 煎痰嗽發瘧加薑製半夏煎本藏氣痛加茴香煎水 七傷脚手心熱煩燥不安肢節酸疼加柴胡去蘆同

扫勞散治五勞七傷四時傷寒山嵐瘴瘧時行疫獨心 强急渾身疼痛 煩悶口苦舌乾增寒壯熱頭疼鼻塞腰脚酸倦背脊 焦壮筋骨祛冷氣快心胸神效莫述 水不調若能每日空心一服即出顏容豐肌體調三 昏夢泄盜 行四肢沉重腿膝酸疼婦人宫藏久冷月 i 尚歸みび 甘草殿公三判不去 七兩三 大平原司印副司方 前胡名二雨 七錢 ٠ ۲

郵定四庫全書 得 ·參輕骨散解利四時傷寒頭痛壯熱項背狗急骨節 右為細末每服二錢水一盏烏梅半箇入鹽同煎如 要出汗加葱白薑同煎連三服溫鹽酒調熱鹽湯亦 疼增寒惡風收體因倦大便不調小便亦澀嘔笋 麻黄江根 內桂片意 苦梗去蘆七天仙藤雨 節 橘紅名一兩 白芷谷以 地骨皮 川芳二兩二 石膏纸 錢半 二錢

痛經候不調 腹痞悶停痰嘔逆冷氣奔衝攻注刺痛及婦人血氣撮 瘴氣時行疫癘潮熱往來及療五勞七傷中脫氣滯心 ī 桔梗毒 見母心去 陳皮 參 風感寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽疾涎及山嵐 白去 茯苓焙白 白术片 赤芍藥 · 大製 蓝 太平惠民和別日子 白並な 秦北去産 甘草 盤二各兩 表名 雨 見 雨 8 产

葱白散解四時傷寒頭痛肚熱筋背拘急骨節煩疼增 金定四庫全書 寒惡風肢體困倦大便不調小便亦澀嘔逆煩渴不思 枸時服 熱服身體倦怠加烏梅一箇咳嗽加聚二枚同煎不 右為末毎服三錢水一盛生薑三片同煎至七分稍 當歸去蘆 乾薑りる 麻黄玉根 一雨半 蒼术 川芎 柴胡王 被积 巻二 六雨浸 一宿 肉桂は 粮炒 函 半

ラー・フ・ハー・ 桂枝汤治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱 山嵐瘴氣時行疫癘並皆治之 飲食又治傷風感寒頭痛體熱質 服不拘時如要出汗併煎三服被益出汗為度 右為末每二錢水一盛薑三片葱白二寸煎七分熱 乾萄る一 麻黄去根節甘草盤 川芎 蒼木浸 米泔 太平惠民和副局方 石高門煅 白术浴

黃龍圓治丈夫婦人代暑發熱作渴嘔吐惡心及年深 者汗自出帝帝惡寒洒恐風角角發熱鼻塞乾嘔 金匠匹厚全書 膏二兩或升麻半兩若病人素虛寒者不用加減無 右為意未母服二錢水一盡生薑三片聚三枚擘破 汗休服 及夏至已前可加黄芩半兩夏至後加知母半兩石 同煎取七分去洋溫服不拘時惟春初可行自春末 甘草 桂枝去 **芍藥**西三

人の日日という 拘急五勞七傷山風瘴氣寒熱往來五膈氣噎咳嗽涎 暑毒不瘥者 不換金正氣散治四時傷寒瘴疫時氣頭疼壯熱腰背 過多藏毒下血大便泄瀉用米飲吞下食前進一日 為圓如梧桐子大每服三十圓熟水本下又療傷酒 右黃連以酒煮乾為度研為細末用麪水煮糊溲和 两服 黄連去鬚三好酒五 太平惠民和副局方 芜

金牙匹居百言 行步喘乏或霍亂吐瀉藏腑虚寒下痢亦白並宜服之 疼鼻塞聲重傷風壯熱肢體煩疼肌肉蠕動膈熱痰盛 川芎茶調散治丈夫婦人諸風上攻頭目昏重偏正頭 土宜服之常服能群感氣調和脾胃美飲食 **滓食前稍热服忌生冷油腻毒物若四方人不伏水** 右為到散每三錢水盞半薑三片聚二枚煎八分去 半夏煮 厚朴盖鬼 霍香上枝 蒼木米州 甘草盤各 陳皮 去 Ú

火門日日と 衣貪冷濕久父得之腰下重疼两脚疼痛腿膝或腫或 滲濕湯治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或強或 婦 **出大便溏泄昏因坐卧濕處或因雨露所襲或因汗出** 右為細末毎服二錢食後茶清調下 血風攻注太陽穴疾但是感風氣悉皆治之 防風雨 荆芥梗去 白芷 海荷葉不見 甘草盤 川芎春四 太平忠民和朝局方 羌活る二 細辛去蘆 常服清頭目 手

寒垢面 冰黄散治胃暑伏熱頭目昏暈 五大口尼人言 不腫小便利反不渴悉能主之 右吹咀每服四錢水 食前溫服 茯苓皮 潜术 丁香分 乾薑一兩 甘草炙 卷二 **盏半聚一枚薑三片煎** 橘紅 白术和各 瀉痢口乾煩渴背

體勞倦壯熱增寒神志不爽感冒瘟疫瘴氣常服群瘟 神仙百解散治傷寒過身疼痛百節的急頭目昏痛肢 疫治勞倦 侇 こうらしょう 石為細末毎服二錢新汲水或冷熟水調下 甘草 山茵陳 生用名 四兩 一般日就寒食奶 柴胡 蘆 太平應尺和劑司方 前胡生薑 赤茯苓皮 汁 三十二

金分四月全世 立春已後不加減立夏已後一料加 **立秋已後減柴胡一分不用當歸茯苓只加** 乾葛春 獨活 崇本品 蒼木米 沒 白木 升麻 當歸各半 半夏藍汁 白芍藥 參盖 老二 柴胡 甘草炙 藿香葉 羌活 防風站

秋定四車全書 怠惰少力咳嗽寒熱羸弱自汗胸膈不宽嘔逆惡心 度骨節酸疼飲食無味四肢疼倦行步喘乏面色痿黄 解散治四時傷寒頭痛肚熱感風多汗及療勞傷過 盞熱服不計時併進二服如要表散加葱白三寸淡 右為細末每服三銭水一盛半薑三片聚二枚煎 政三十粒同煎服以衣被益覆汗出而愈 立冬已後並無加減一方無當歸有黃芩其屬 肉桂去食 太平惠民和副尚方 乾薑地谷 Ī

粘痰嗽壅滞或目涉風濕增寒發熱骨節疼痛或中暑 石為細末毎服二錢水一 甘草 同煎七分温服不拘時 温 少寒氣脉不和增寒北熱鼻塞腦悶涕強桐 和汗泉 以將理失宜食復勞復病證如初 二兩 一盏生三片来 道 白术 一枚葱白

飲定四車全書 四 治五勞七傷氣虚頭眩精神恍惚睡卧不寧肢體倦怠 肠膨脹婦人胎前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省 氣咽塞上氣喘促坐卧不安或飲食所傷胸腸痞悶腹 潮熱盗汗脾胃虛損面色痿黃飲食不美口吐酸水藏 腑滑泄腹内虚鳴反胃吐逆心腹絞痛久瘧久痢及膈 事常服辟四時不正之氣及山嵐庵疫神效不可具 白术 太平應民和副局方 山藥

霍香前氣厥入鹽湯調下 麝香少許中暑嘔逆入香薷產前產後血氣不和入 片紫蘇三葉前七分食前服若吐瀉入白梅前鳴入 右為末毎服二銭水一盛薑三片聚一枚木瓜乾 桑白皮杏仁煎傷寒勞後入薄荷腸氣入木通三寸 甘草 香附子為三 白芷 陳皮は 青皮は 茯苓点

大こう!ヨハニ 痛如破者 荆芥散治傷寒頭疼臭塞流涕聲重咽乾胸膈滿悶頭 頭痛目取四肢拘倦欬嗽多痰胸湍氣短 **抄湯治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷** 右為瓮末每服五錢水 去滓通口服以衣被益覆睡取微汗為度 麻黄亦去 天南星 杏仁皮失 草鳥頭 太平惠民和削昌方 一盏半薑五片同煎至一 甘草等外 荆芥穗百年 生用 么 弄四

拘急渾身疼痛煩渴悶亂大小便滋嗜卧少力不思飲 金好匹母全書 來蘇散解利四時瘟疫傷寒身體壯熱頭痛增寒項背 食及諸氣疾五勞七傷山嵐瘴瘧寒熱往來並皆治之 薄荷三葉水二盞同煎八分通口服 右為細末毎服二錢陳茶末 荆芥穗 肉桂木見 枯梗 一錢生薑自然汁少許

人口可自己 神湯治時令不正瘟疫妄行此藥不問陰陽两感或 不拘時常服和順三焦辟瘴氣進飲食 石為細末毎服二錢水一盏薑三片同煎八分熱服 甘草食 甘草 神皆可服シ 兩半芍 去 白 麻黄去根 沙樂 平雨 太平惠民和顧母方 紫蘇去養 **芳**者一从蜜 川芎 陳橘皮 辛五

金分四届全書 非淺 服如傷寒不分表裏以此導引經絡不致變動功效 中湍氣實加枳殼數片同煎及產婦嬰兒老人皆可 右為細末毎服三大錢水一 去洋熱服不拘時如發熱頭痛加連鬚葱白三並如 乾萄汁四 白芷 升麻 きニ 一盏半生薑五片煎七分 四

火とりいという 藏腑虚鳴山嵐瘴瘧遍身虚腫婦人產前產後血氣刺 痛小兒疳傷並皆治之 右為細末毎服二錢水一盏薑三片聚一枚煎七分 人般風疾五般膈氣心腹冷痛及胃嘔惡氣瀉霍亂 甘草六西 白术 腹皮 霍香去五 茯苓皮去 陳橘皮 厚朴盖注製半夏麵 太平惠民和劇局方 **岩梗** 白芷 手た

服益脾胃散宿疾停飲能進食群風寒暑濕霧露之煎 受寒邪增寒壯熱身體疼痛肢節倦怠霍亂嘔吐脾疼 香薷汤宽中和氣調禁衛治飲食不節饑飽失時或冷 **翻胃中酒不醒四時傷寒頭痛併進三服得汗即愈常** 動氣便欲飲食致令脾胃不和胸腸痞滯內感風冷外 物過多或硬物種財政食軍便無或驚憂患怒或勞役 金グロガ 熱服如要出汗衣被益再煎併服 香薷去土 甘草 白扁豆 炒

次定四東と馬 水浸丹治伏暑傷冷冷熱不調霍亂吐利口乾煩渴 右同研匀用黄蠟鎔作汁別為圓如梧桐子大每服 右為末毎服二錢沸湯入鹽點服不拘時候 五圆以水浸少项别以新汲水吞下不拘時候 厚朴盖泉 巴豆膜研細取盡油如粉黄丹一兩一水 R 太平惠民和利局方

五岁日人人二十 きこ

欽定四庫

太平惠民和潮局方卷三

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

校對官主事臣陳文極 總校官編修臣王熊緒 謄録監生 臣左顕若

こうしょこし 大戶息司四門多方 狐狸等病府香蘇合 **痿疰忤鬼氣平心痛霍** 州瘀血月閉疹 陳師文等 撰

多定正库全書 服旋丸如桐子大早朝取井華水温冷任意化服光 右為細木入研樂引用安息香膏并煉白密和劑每 龍腿研 麝香研 小兒可用一九温酒化服亦得並空心服之用蠟 董陸香川两 沉香 研水飛 香附子炒去毛 蘇合香油力 白檀香 丁香 八各一两人安息香膏 河梨勒煨取皮 華松西三 安息香山升热膏

治之 **吐不止宿飲不消胸膈刺痛時吐清水不思飲食並皆** 心下坚痞腹中 安息香丸治一切冷氣心腹疼痛胸膈噎塞脇肋膨脹 紙裏一 不敢近 内柱 阿我餅子炙今黃熟用一分阿我納研白麵少許沒和作 九如弹子大以稍袋盛當心帶之一切邪神 二两半河子凡 虚鳴職逆惡心噫氣吞酸胃中 一两 茯苓白 スト見えい刊うと 川芎 嘔

銀定匹庫全書 右件藥除安息香硼砂外並一處 杵羅為細末用蜜 五味子微妙巴戟去心 白豆蔻丁香蜂生書 野 教三是是 乳香別研 春附去毛 華澄品 胡椒 益智一两半硼砂酒半盛化去 尚春微妙 丁香雨各一 お樂 髙良酱 炒 裁浅 木香 白豆蔻去皮各 安息香酒半盆化去砂 檳榔地 三稜炮 縮砂 沉香

治之 翻胃隔氣宿食留飲心痛霍亂婦人血氣心腹痛並皆 痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中冷逆嘔吐不止及 丁沉丸治一切冷氣攻心腹脇肋脹淌刺痛胸膈噎 生薑湯下亦得食前服 三十两入安息香硼砂於家中 一十下丸如雞頭子大每服一九細嚼温酒下 甘草 ストをしい用うり 白豆蔻 濃煎

欽定四庫全書 大沉香丸治一切冷氣攻心腹刺痛胸膈噎塞嘔吐痰 衝腰背拘急臍腹絞痛手足逆冷小便滑數又治空 暗氣吞酸口苦舌溫不思飲食及膀胱腎間冷氣攻 九細嚼炒生薑鹽湯下温酒亦得空心食前服 右為細末入麝香令末煉蜜和丸如酸素大每服 肉桂 白术 内豆蔻 乾薑 訶梨勒 沉香 **尽三月日日年前名**分 麝香 木香 人參 茯苓 檳榔

脇逆淌噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫醋吞酸口苦 心痛霍亂吐利頭腦疼痛婦人血氣刺痛並宜服之 理中九理中焦不和胖胃宿冷心下虚痞腹中疼痛胸 妙生薑鹽湯下元氣發動炒尚香熱酒下空心食服 右為末煉蜜溲和每一兩作二十九每服一九嚼破 盖黄去皮 白豆蔻半两沉香兩一十香附子去毛 天台烏藥 檀香 白芷 廿松洗 肉桂去粗皮 乾薑地 甘草

一般不化 亂吐利心腹絞痛手足不和身熱不渇及腸鳴自利米 欽定四庫全書 失味怠惰嗜卧全不思食又治傷寒時氣裹寒外熱霍 沸湯化下嚼服亦得或丸如桐子大服並得大病新 右為末煉蜜為九每一兩作一十九每服一九食前 消痰逐飲順三焦進飲食辟風寒温冷邪氣 差多嚥不止及新産内虚可以服之常服温牌暖胃 白术 乾薑丸 <u> 泰三</u> 太平息民和朝局す 世世 四 祭4两

吐痰逆噫氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脇剌痛便 和脾胃調進飲食 化心腹痞淌並宜服之此藥老幼氣的皆可常服能温 不調少力嘴卧體重節痛及治虚勞脾胃虚弱飲食不 和胃丸治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔 鼈甲九斤大者 厚利二兩研 炙作 黄餅 子 去粗皮 剉 惻 た 神神 神神 鼈一 甲枚 薛以生蓝半夏 内黄 慢温 **火外** | | | | | | 取术雨炒 半湯 二酯 半生薑 白术 雨二 洗 細碗 如硼两炒製微

欽定四庫全書 飲食不下嘔逆欲吐及治肺胃傷冷咳嗽痞湍或上氣 **紫蘇子九治一切氣逆胸膈噎問心腹刺痛脇肋脹淌** 右為細末蜜丸如小豆大每服二十九加至三十九 微嚼破温水下不計時候 乾薑丸 檳榔 青皮去白炒人於西三 粉用 内桂去粗皮 赤茯苓去皮 當歸各一兩 为樂 中惠民和削向方 可子比去校康皮去白 积設去樣妹

ノン アシー・ニー 奔急不得卧 乱甚妙 温酒下米飲亦得不拘時侯或作小丸服之亦得若 右五味為細末煉蜜和丸如弹子大每服一丸細嚼 食水膽生冷覺有所傷感氣生熱欲成霍亂者含化 九細細燕汁服畫應時立愈常服此藥永不患霍 紫蘇子棟净陳皮去白 内桂去粗皮人参去蘆 高良量炒各一 大半息民和則局方

飲食 多庆四月全書 **逆惡心噫氣吞酸泄瀉腸鳴米殼不化肢體緣怠不思** 養脾九治脾胃虚冷心腹絞痛智膈淌問脇肋虚脹嘔 五膈丸治因愁憂思慮飲食不節動氣傷神致陰陽 湯送下食前服此藥養胃進食 **占為末煉蜜和九毎兩作八九毎服一丸細嚼生薑** 大麥葉炒 納砂去皮午白木半斤 白茯苓去皮 甘州一片 去蘆各 f

手足逆冷上氣咳逆喘息短氣 和腑臟生病結於胸膈遂成憂膈氣膈食膈飲膈勞膈 引背督食即不下心下堅痛痛即欲吐得吐即己甚者 之病岩食生冷即發心胃痞淌氣不得通疼痛如刺及 右為細末煉蜜和凡如弹子大每服一凡含化嚥之 蜀椒出月并閉口者 遠志去心 麥門冬姑心甘草各五雨乾薑儿雨 人参四兩 附子一兩半 · 八十也之口刊引す 細辛去苗土肉桂 粗

苦吞酸骨淌短氣肢體怠惰面色妄苦如中焦虚疹不 骨膈痞問脇肋脹湍心腹剌痛不思飲食或多痰逆口 · 結水九亦名 設神散治中淌下虚五噎五膈脾胃不和 金炭正母全書 任攻擊藏氣虚寒故 受怯弱不能多食尤宜服之常服育神養氣和補腳門 **胃膈喉中當熱藥力稍盡更服一九日三服夜二服** 服 服藥七日即愈或九如桐子大温酒服之亦得食後 城補或因病氣表食不復常票

在一十十五度用薑汁與酒合本,得不至我食香熟做焦 穀集微炒 人參去蘆 枇杷葉今香熟為度 甘草一兩半半夏湯洗上過一分一分切片子與 白豆蔻出皮桑白皮各中的白木二两 檳榔炒 縮砂去皮兩大腹子微炒藿香葉 汁炙 五味子 沉香 石斛細對酒木香 一般炒白茯苓 神麵做炒 青皮去 粮 皮去白

銀定四庫全書 惡心或時嘔吐心下虚痞膈塞不通飲食減少短氣羸 理中湯脾胃不和中寒上衝胃脇逆淌心腹疼痛痰逆 因温中逐水止汗去濕又腸胃冷濕泄鴻注下水殼不 治陰陽使無變動烈日得安如療五噎入乾肺一枚 枚同煎至七分温服不拘時候及療四時傷寒能調 五枚同煎婦人亦可服 同煎十服見效如療膈氣吐逆羸困入薤白三寸棗 右搗雞為末每服二錢水一盞入生薑二片肥麥二

淌短氣煩悶痰逆惡心飲食少味肢體多倦常服飲食 骨痹心痛逆氣結氣並皆治之 空心食前 **石热粗末每三錢以水一盞/半煎半盏去查稍熱服** -沉香湯調中順氣除邪養正治心腹暴痛胸膈痞 府職和平肌膚光潤顏色紅白 雷鳴傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷 甘草炒 ことなくのりりす 白术

銀定四庫全書 脹滿噎塞止嘔吐惡心常服調順脾胃進美飲食 勺氣散治氣滞不勻胷膈虚痞宿食不消心腹剌痛除 右為細末入研藥勺每服半錢用沸湯點服或入生 薑一片鹽少許亦得酒食後服之大妙 麝香并分 木香 雅香柴 沉香二两 檀香 甘草各人兩白豆蔻仁二兩 白豆蔻仁两一 生龍脳一致甘草一致 木香的二 縮砂口兩

攻擊心股根痛並宜服之 暖腰膝去邪氣治吐瀉轉筋癥癖疼痛風水毒腫冷風 麻痺又主中惡心腹痛蠱毒症忤思氣宿食不消天行 烏沉湯和一 侯 右為末每服一錢入鹽末一字用沸湯點服不計時 <u> 段膀胱肾間冷氣攻衝背脊俯仰不利及婦人血氣</u> 切氣除一 5 沉香五十 切冷調中補五藏益精壯陽道

欽定四座全書 五膈竟中散治因爱悉寒熱動氣傷神致陰陽不和腑 右為末每服五分入生薑三片鹽少許沸湯點服空 心食前服

淌吃椒醋心飲食不消大小便不利三曰氣膈胃脇还 氣結津液不通飲食不下羸瘦短氣二日志膈心下實 朧生病結於貿 膈之間遂成五膈之病一曰 憂膈智中

滿噎塞不通憶開食臭四曰寒膈心腹脹淌咳嗽氣逆 一苦冷雷鳴繞臍痛不能食肥五曰熱膈五心中

痛胃痺引持不能多食乃一切氣疾並皆治之 右為細末每服二錢入生薑二片鹽少許 不計時 白豆蔻二兩甘草 香附子十六兩 熱爛生瘡四肢煩重唇口氣燥身體或熱腰片 丁香 **土種膈氣三** 青皮去白 丁五两 一片岳气四月为年 陳皮 木香三雨 去白 去皮生薑汁炙熟 各四兩 縮砂仁

吞酸羸瘦少力短氣煩問常服順氣宽中消疹癖積聚 **朘膨脹肠肋刺痛食飲不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦** 欽定四庫全書 散為憂意氣 石為細木每服二錢水一盛入生薑二片東半個同 由豆蔻な 内桂去粗皮陳皮去穣 积裁去粮处谷十两 甘草瓜兩 三稜炮 N.S 木香 益智 いい、 檳榔 厚朴去皮生薑汁製炒 青夏去白 我茂凡

股剌痛脇肋膨脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄利水殼 不化肢體倦怠不思飲食 煎七分和查熱服如不及煎入鹽少許沸湯點服亦 湯治脾胃不和中脫氣滞宿寒留飲停積不消心 青州来 以上六味用水三卧类令水盡焙轧 各五 清洗去乾薑丸

欽定四座全書 **岩無味胸淌短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體** 平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹淌剌痛口 瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五噎 服食前 **右粗末每服二錢水一盞生薑三片煎六分去渣温 痞膈氣及胃並宜服之** 草豆蔻去皮 河子烙瓜皮白水 太平忠民和副司方 र्मेश 霍香 <u>+</u>

氣壅滞肢節煩疼頭面虚浮手足微腫腸胃燥澀大便 二和散治五藏不調三焦不和心腹痞問脇肋腹脹風 風寒冷温四時非節之氣 抢沸湯點服亦得常服調氣暖胃化宿食消痰飲碎 右為細末每服二錢以水一盞入生薑二片乾麥肉 兩枚同煎至七分去薑水帶熱服空心食前入鹽 陳皮去白斤二兩 去粗皮水泔浸 二日五斤 甘草二十两 厚朴去粗皮薑汁製炒

及脚氣上攻胸腹滿悶大便不通 秘難錐年高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲食 之氣湯治虚冷上氣及寒氣熱氣怒氣患氣毒氣憂氣 不計時 右為粗末每服二三錢水一盏煎至六分去渣温服 羌活去蘆 甘草炒 白木各三分宣木瓜落切大腹皮炙焦黄 陳皮去白 紫蘇其梗去沉香的 太平 惠民和制的方 檳柳熟去起木香 **考**第二雨 ţ

孟智散治伤寒陰盛心腹痞滿嘔吐泄痢手足厥冷 愁氣內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食 止發即欲死此藥主之 石為粗未入半夏令匀每服三錢水一大盞入生薑 一片煎七分去查稍熟服食前 半 **飛衝心脇臍股脹満絞痛** 湯洗上次 切片焙轧 砌 甘草矣 肉桂 一兩人

欽定四庫全書 藿香半夏散治胃虚中寒停痰留飲噦逆嘔吐胸滿噎 痞短氣倦怠不思飲食 服食前 右為散每服二錢水一益生薑七片煎七分去渣温 右件為散每服三錢水二盏入鹽一稔生薑五片來 一枚擘破同煎至八分去渣温服食前 丁香皮半雨 川烏將去皮益智去皮 藿香葉 巷王 | 艮本麻足方 一兩半夏炒黄色 三兩 乾薑地 青皮 1 一去面白

積氣丸治陰陽不和臟腑虚弱寒冷之氣 留滞於內使 或霍亂嘔吐心腹剌痛腸鳴泄利水殼不分 時候夏月煎作熟水常服調中止逆除冷氣消飲食 豆蔻散治脾胃不調胸膈滿悶飲食不化嘔逆惡心 右件拌匀入於銀ൈ內用水過三指許以慢火熬冷 水盡焙令氧杆為細末每服一錢用沸湯點服不計 草豆蔻一斤 不散胃脇支滿食即氣噎心腹膨脹氣剌氣急宿 生薑切作片 甘草ツ 兩

牀面黄肌热精神因頓 食不化心腹引痛噎氣吞酸停飲浸渍惡心嘔逆 痛減腑不調飲食不進往來 附 取百雙个 半去慢升 个去皮 成砂 膏大 黄 去 妙 ıU: 三膜 粗 11. E 民和乔公方 同銭出た 皮 棚砂新 盤 中酷矣黄 、超裏 兩皮 雨 煨半 尖 越 去 超為 炒 研飛 雨各 别 * 末 堋, 研

噎不通及癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食並治 之常服消飲食行滯氣 肋刺痛胸膈痞悶或反胃惡心飲食不下氣上衝貿膈 **亅香丸治積滞不消心腹坚脹痰逆嘔噦噫酸吞酸脇** 九炒生薑湯温下或木香湯亦可食後臨卧服更看 **占為細未入研藥勺以醋膏為丸如梧桐子每服** 虚實加減服之忌生硬冷物 猪牙皂角指牙皂去 皮炙 好墨烧船淬 肉柱 皮去 粗

铋定四座全書 後臨卧服之 酒化下如要取化癥瘫瘕塊用生薑湯下上丸並食 右以大黄硼砂已膏和九如菜豆大每服一兩九茶 乾薑 香丸消積滞生冷留飲宿食止痰逆惡心霍亂 里库 乾漆 碎炒今州立為細木附子兒去皮臍各二兩 巴豆霜先用醋煎硼砂令熱下已豆霜煮青皮 牛姆為川大黄 細末達我茂此松京三稜路 硼砂 j) 邓岛 研

胃進飲食 吐心腹脹問脇肋剌痛胃膈痞湍噎塞不通常服順胖 右為細末入巴豆令勺超糊和令得所丸如泰米大 每服五丸至七丸温生薑湯下橘皮湯亦得食後服 如霍亂吐逆煎桃葉湯放冷下小兒吐逆不定三歲 兒服三丸五歲已下服四九用生薑桃葉湯下 **向豆蔻去** 数三十 五靈胎十二兩 木香三兩 巴豆二百十 去皮出 粒油 兩

堅脹脇下緊硬胸中痞塞喘滿短氣噫氣不通嘔吐痰 欽定四庫全書 逆飲食不下大便不調或泄或秋 稜煎凡順氣寬中 右件為末以三稜膏勻溲和丸如梧桐子大毎服十 五九至二十九温米飲下食後服 炒黄色皮尖麸 石器內 φŋ FI 青皮 熬搖 成羅 消積滯化痰飲治中脫氣痞心腹 去白 ġ, 民和 硼砂香研 刺马方 難白子 微妙乾 働 神 ţ 文教炒 碎 炒 雨各

火足り年心情 到 服痛心下坚痞肠中水聲嘔噦痰逆不思飲食 青木香丸宽中利膈行 後可服五九或七九小兒一歲服一九懷好婦勿服 菜豆大每服二十九茶湯熟水任下食後服每酒食 右為細末入牵牛未令勺漸入清水和令得所凡如 旧骨脂炒香 檀柳殿栗米飯裹濕紙包, 華澄茄十两黑牵牛一百四 太平忠民和副局方 滞風消飲食治胃腸噎塞腹肠 掘 四 Þ 末十 啊 百炒

消食丸治脾胃俱虚不能消化水殼胃膈痞悶腹脇時 穀氣或因病氣食食不服常並宜服之 脹連年 累月食减嗜卧口苦無味虚羸少氣又治胸中 金グロルとうし 有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及病後新虚不勝 獨聖凡治脾胃不和飲食多傷心腸刺痛嘔噦惡心 加至二十九米飲下日二服不計時候 后件為末煉蜜和溲為凡如格 桐子大每服十五九 烏梅去林 乾薑 叁三 小麥蘇少黃神 妙两二錢) 松木学

とこうらいたう 温白九治心腹積聚久 噎痞吞酸氧噫食臭腸腹脹悶不思飲食 右為細末入巴豆 利胸膈少逆消食 肉桂 每服三凡至五 去核 各煨 斤粗 四塩 皮 雨碎 巴豆 硼砂 九用温水下食後 硼砂匀水煮麸和糊為丸如麻子 太平息民和利尚方 三連銭皮 癖塊大如杯椀黄疸宿食朝 研 科半雨去皮 當歸 去蘆 (V) 九 膜 炒 熟 者舶 上 得

起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來擔心傍攻 金月四月全書 樂飲食無味月水不調及腹中一切諸疾有似懷平 諸疾斷續不生帶下淋濯五邪失志心愁憂思慮意不 及療七十二種風三十六種氣過戶在件及癲癇或婦 疾九種心痛積年食不消化或瘧疾連年不差及療 **兩肠十種水病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋** 切諸風身體頑痺不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落 年累月羸瘦困弊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不

除愈 九生薑湯下食後或臨卧服漸加至五七九 右為細末入巴豆勻煉蜜為九如梧桐子大每服三 乾薑丸 川烏地去皮 桔梗 紫苑去 黄連 半柴胡 皂炭去皮子 菖蒲)去鬚 去粗皮 及於去皮巴豆去皮心口 蜀桃 厚朴去粗皮薑 吳朱英湯洗之次時転炒 去日及閉口 汗 善計 半 E 兩膜 製 炒 出 出 油

欽定四庫全書 馬墮車痰血等疾 悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去 米心痛又治連年積冷流注心胸痛并療冷衝上氣落 九痛九治九種心痛一蟲心痛二疰心痛三風心痛四 酒下一九卒中惡心腹脹痛口不能言服二九立蹇 右六味為細末煉蜜和凡如梧桐子大每服空腹温 狼毒人雨 巴豆 去皮心膜炒乳取霜其茱萸汤洗七次各二 附子 府三两東盖地 参三太平原民和剽药方 于

噎一切氣疾常服除邪冷生胃氣 噫醋吞酸痰嘔吐逆胃膈痞悶飲食不香人治五膈五 生氣湯治男子婦人一切冷氣攻心腹脇肋脹滿剌痛 錢至一錢用沸湯點服不計時候 右七味碎同搖用慢火爐令香熟乘熱入磁花內家 益覆候冷碾羅作細散客盛貯勿令泄氣味每服半 檀香华 鹽 二雨半 一两 一两 炮 胡林一钱半丁香 甘州各二雨

欽定四庫全書 陽經偏正頭疼痛連腦巓吐逆惡心目瞑耳聾常服清 如聖餅子治男子婦人氣殿上盛下虚痰飲風寒伏留 頭目消風化痰暖胃 每服五餅同荆芥三五穗細嚼茶酒任下熟水亦得 右為細末湯浸蒸餅和丸如雞頭大捻作餅子曝轧 乾薑炮 防風 川島去皮尖川芳 半夏生兩天南星 甘草一两

弱者悉宜服之 俞 くこうう 痛頭放目暈四肢怠倦小便滑數泄瀉不止凡藏氣虚 鹽少許煎七分空心食前服 石為細末每服二錢水一 喘滿咽靴不利煩渴八 香濕紙 111 氣湯治虚陽上攻氣不升降上盛 元歲氣虚真陽耗敗兩耳常 茯苓 太平忠民和朝勾方 引飲頭目各腔腰脚無力四 大為生薑二片養 附子鄉去皮 Ī - 虚膈壅

神保丸治心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯 肢倦怠咳嗽無治風濕脚氣 銀戶四月至書 葉生薑三片來! 枚煎至七分去渣食後服 **右十五味同作粗末每服三錢水一盞半入紫蘓!** 陳皮士白 當歸 前胡 附子凡去火羌活 半夏越人兩點量兒 松蘇子微炒甘草 五茄皮蜜汁學小當汁浸食民去蘆 桔梗炒 **为桂**不見火

茶酒漿飲任下諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治獨 差乃流入肖膂久之义注右脇攣痛甚苦乃合服之投 輒能去之有人病項筋痛諸醫皆以為風治之數月不 止用桑白皮糯米飲下腎氣脇下痛炒茴香酒下大 **てこしこここ** 而差後常再發又 不通蜜湯調檳榔木一錢下氣噎木香湯下宿食不消 分同研為散煎杂根白皮糯米飲調下三錢氣小 血痛炒薑醋湯下肺氣甚者白礬蛤粉各三分黃丹 太平惠民和劉昌方 Ŧ

多方匹丹全書 撞氣阿魏湯治五種噎疾九般心痛蹇癖氣塊冷氣攻 肠氣婦人血氣血刺等疾 及脾胃停寒胸滿膨脹腹痛肠鳴嘔吐酸水丈夫小 砂為衣每服三粒湯使如前 右為細末入巴豆霜令勻涉釋蒸餅九如麻子-齿香 川営 炒 青皮去白 陳皮各一兩 胡椒 各一錢巴豆研十个乾鍋 甘草 白芷 半雨 胡椒 錢 者个

滿端促短氣乾歲煩滿咳嗽痰涎口中無味嘴即減食 火已口戶 沉香降氣湯治陰陽壅滞氣不升降胸膈痞塞心腹脹 又治胃痺留飲憶醋開酸脇下支 **硃砂七錢為衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下 占擔為末用阿魏糊和丸如雞頭大每樂園** 肉桂 縮砂 血氣以酷湯下常服一 半去 去 阿魏 生薑 為醋糊浸 太平息尺和刺丹方 **粒爛嚼茶酒任下** 宿 ~ 結常覺妨悶及中 錢 ¥, [ō] 粒至二 茜 丁香店 粒粒 南

をグロスとうすい 胃消痰散壅思食 小烏沉湯調中快氣治心痛刺腹 ·毒氣上攻心肠堅滿肢體浮腫者尤宜服之常服開 空心服食去邪惡氣使無瘴疫 后為細末每服一錢入鹽少 **脬濕洞泄兩脇虚鳴臍下榻痛皆能治之患脚氣** 香附四十兩沉香 甘草 丰 一两 兩 縮砂仁 一許沸湯點服凌旦露露 香附子 毛赔轧二十两沙盆内浸去皮 西甘草 爁一百

衛治心胸痞問噫酷吞酸嘔逆痰水津液不収兩脇剌 痛腹中堅滿口舌無味不思飲食 >沉煎札碎露霧寒邪散膈脫凝滞調順三焦和養榮 不拘時 **占為細末每服一錢入鹽少許或不若鹽沸湯** 右為細末別用甘草熬膏子為丸每一兩分作二百 丁香十二 白豆蔻仁九兩半 沉香一雨 **木香**一錢半丁香 啊

大元 10年公子

太平息民和朝司方

茊

英歲月漸致虚弱面黃肌瘦飲食或進不進大便或私 頭旋 感應九治中焦積冷氣弱有傷停積胃脫不能傳化或 產有傷若久有積寒喫熱藥不效者人治久病形羸往 因氣傷冷因飢飽食醉過多心下堅滿兩脇脹痛心腹 大疼霍亂吐瀉大便頻併後重遲澀久痢赤白膿血相 金ダでだろうで ·米殼不消愈而復發人治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡 五十九毎服一粒含化空心食前常服 胸膈痞問四肢俸怠不欲飲食又治妊娠傷冷新

成效者不拘老幼虔心服饵立有神效 改定四車全島 图 服進飲食消酒毒令人不中酒又治小兒脾胃虚弱累 或泄不拘久新積冷並悉治之大病不過三服便見痊 有傷滞糞白鮮臭下痢水殼每服五粒黍来大氧薑湯 化積聚消逐温冷療飲食所傷快三焦滞氣旋儿 愈此藥温無毒並不澡熱不損胃氣亦不吐瀉止是磨 下不枸時候前項病證連綿 豆大每服三五粒量虚實加減温水吞下不拘時候常 太平惠民和利局方 月日用熱藥及取轉並不 六六

與前三味同拌研今細用好蠟匱和先將蠟六兩鎔 右除已豆粉百州霜杏仁三味外餘四味構為細 肉豆蔻七升 鎔穀沸 百草霜 作汁以重綿濾去渣以好酒一升於銀石褐內煮 合用清油一两於銚内熬令末散香熟次下 刮 皮者 碩出候酒冷其蠟自浮取蠟秤用凡春夏 首林 皮 細莊汤雙 研家 浸仁 一十個巴豆和出 宿 ij 剂 迅 川乾薑地製 研十 個 南木香 盂個 油去如皮 两去 基 核心 膜而新研半棟 頭 =

次定四車全等 一周 脹腸鳴心腹疼痛噎塞膈氣翻胃吐食飲食減少 小理中丸治三脫氣弱中焦積寒胖虛不磨飲食運化 分作 候合用清油一兩半同煎煮熟作汁和匱藥末成劑 蠟四兩同化作汁就鍋內聚熟拌和前項藥末秋冬 青皮 紅豆 頻傷胸膈淌問脇肋疠剌嘔吐噦逆噫醋惡心腹 小鋌子以油单子紙裹旋九服餌此高成 人去白粮陳皮 去碎煨白棉来 太平惠民和副局方 熱納砂仁各 Ír 兩 良量少斤 学正覧根 支 也前家

接翻胃霍亂吐鴻並皆治療 心膈噎塞漸成膈氣解泄瀉痢氣刺氣在中酒吐酒冷 大七香九治男子婦人脾元氣冷胃氣虚之不思飲食 虚寒者最宜服 右為末水煮超糊九如桐子大每三十粒生薑橘皮 香附子一百九十二两 下温湯亦得不拘時此藥無利性不損氣脾胃偏 一稜蝶私为桂各二兩阿魏西仍作所產

酸氣膈食噎飲食不下冷涎翻胃腹胖 小七香九能温中 湯亦可大有神效忌生冷肥腻等物 下婦人脾血氣如経月水不調並用炒薑酒嚼下醋 右為末煉蜜為九如弹子大每服 縮砂 臉俱黃赤 四 快 囱 白痢疾 木百五十两 陳 膈化積和氣治中 去籼皮二 二百五 去台 粒鹽酒鹽湯嚼 服疼遠年茶 酒吐酒嘔逆 胖血氣, + 甘貲 兩

郵定四庫全書 連翹九治男子婦人脾胃不和氣滞積聚心腹脹滿乾 拍氣並宜服之 蓋湯熟水任下或氣服滿磨烏藥水煎湯下或酒食 **過度頭疹惡心胸膈滿悶先嚼二十九後吞二十九** 右為末水浸蒸餅為丸如菜豆大每服二十九温酒 生薑紫絲湯下此藥性溫平不動臘腑 甘草炒一百莲我大股垂然縮砂仁各二十 甘松 十兩益智仁助十十丁香皮 香附起

虚腫行步不能但是脾 嘔醋心飲食不下胸膈噎塞脇肋疼痛酒積面黄四肢 婦人諸疾薑醋湯下不拘時孕婦莫服 右為末麵糊為九如梧桐子大每服三十九生薑湯 下久患赤白痢疾及腸風私脾毒減血黃連煎湯下 为桂不见火 連想洗 三核地二百四十 好墨城門類 陳皮四十四青皮 奉牛子母山十两 月諸疾皆宜服之 -}-逢我术 肉豆蕊 旭

欽定四座全書 胃間遇飲即吐久而成癖 酒癥丸治飲酒過度頭旋惡心嘔吐不止及酒積停於 酒每服一粒茶酒任下 大候稍乾入麩內炒香将一粒放水中如藥粒浮 右三味同研細入白麵秤重五兩半消水和如豌豆 水上即去幾不用每服二粒温酒下食後服尋常傷 雄黄煤如六個巴豆不出 **热飲治男子婦人胖胃不和胸膈噎塞腹脇** 連民和在 油皮 蝎 \mathcal{E}_{i} 村十五 す 倘 六九 灰足四車全書 图 四倍飲治大人小兒脾氣不順補虚進食 疼痛氣促喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止 癥十五斤掐碎同一處拌匀每服四錢水一大盞生 **右八味㕮咀為粗末秤二十斤净入揀娥枝葉品 薑三片入鹽少許同煎至七分去渣空心食前常服** 和胃進食 五味子法 極桑白皮 吳則陳皮去白 大腹皮 太平惠民和利司分 甘草 主 剉

澀心腹撮痛嘔逆宿水脇下疼問喘消氣急倦怠少 全不思飲食常服寬胸膈散滞 心温服 香餅子治脾経虚冷胃脫寒痰胸膈噎塞痞口淡舌 石為末每一 縮砂仁 十二檀香 一去 大錢水一盏薑三片聚一 木香 一去藏 四 二兩半 两 河子煨去 廿松五洗 氣消停寒美飲食 兩 個煎六分空 核 白木 兩四 四 兩

议定四車全書 草巢飲治胖寒瘧疾 不拘時候 服二查併煎當發日連進三服無不效驗 捏作餅子每服三五餅子細嚼生薑湯下温酒亦得 右等分為末每服二大錢水一盞煎至七分去查熱 右為細末別用甘草熬膏為丸每兩作二百五十丸 高良蓝炒 紫統葉 青橘皮好白甘草炒 草葉仁 太平息民和到白方 川芎 白芷 ÷

止常服健脾胃美飲食辟寒邪卷正氣 **報吐咽膈噎塞悶兩脇肋疠剌嘔吐穢逆噫酸惡心** 右為細末 煉蜜為九每一兩 作一十二九每服一九 滿短氣惡聞食臭及療留飲腸鳴濕泄冷瀉注下不 細嚼生薑橘皮湯米飲亦得空心食前 内柱二十八 高良量四斤乾量丸 良薑丸温脾胃順三焦治寒痰聚結氣壅不通食 承) 白水四兩一甘草塩

櫻薑九治本職虚飲食不化或成疹癖或發心痛冷積 水飲結聚疼痛一切冷氣等疾 剜去心子約容硼砂半錢實之却以附子末和麵作 右用大附子五十個各重半兩者去皮臍以尖刀子 同為細末以水為丸如雞頭大復以生薑一塊擘作 餅子襄附子用文武火煨令黄用水香如附子之 兩片以樂在內濕紙裹令煨侯薑熟白湯嚼下服 附子 硼砂 木香 生醬

歇定四座全書 紅丸子治丈夫 服養氣育神醒脾脫色順正辟邪 参苓白术散治脾胃虚弱飲食不進多困少力中 右為細末每服二錢麥湯調下小兒量崴数加減 桔梗炒全深黄色一斤 白扁豆薑汁沒去皮微炒 蓮子肉 去皮薏苡仁 松氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳噫此藥中和不熱久 E S **積氣滞胸膈滿悶面黄腹脹四肢** 惠民本府司方 縮砂仁名 甘草 白茯苓 白水 二斤 湍癌 服

血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣 急不嗜飲食漸成牌勞不拘老少並宜服之 力酒積不食乾嘔不止背脾連心胸及兩乳痛婦 右為細末用醋殼糊為丸如梧桐子大礬紅為衣每 乾畫鬼 京三 私汤治男女虚陽上攻氣 不升 食後薑湯下小児臨時加減與服 胡椒各三斤 降上盛下 去白 屈膈

欽定四庫全書 肢體倦怠腹肚疗刺冷熱氣瀉大便風秘澀滞不通 壅痰多咽喉不利咳嗽虚煩引飲頭目昏眩腰疼脚弱 體浮腫有妨飲食 右為細末毎服二大錢水一盞半入生薑二片來 清神順氣和五職行滞氣進飲食去濕氣 前胡去蘆 紫絲子 個蘓葉少許煎至八分去渣熱服不拘時侯常服 Ţ 厚朴 去粗皮蓝 各二两半川當師 汤洗七次 兩 汁 拌抄各 去虚 一两半廿 肉桂 爁 兩皮兩

痛並能治之 肌瘦四肢倦怠又治婦 於內停積不消胸膈脹滿攻剌腹脇惡心嘔逆面黃 右為細木每服二錢熱酒調下婦 力桂各五兩壮媽 散治遠年近日脾疼翻胃口吐酸水寒邪之氣留 胡索 去皮良酱炒 四殿 人血氣刺痛小腹連腰攻疰重 平息气与引为方 再 甘草 十两 、淡醋湯調服 苗香 胁 如

銀兵匹牌全書 病之後貿膈虚痞不思飲食並皆治之 菱黄口苦舌氧飲食減少日漸羸瘦或大腸虚秘或因 塞不通噫氣吞酸嘔熾惡心頭目昏眩四肢倦怠面色 散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞問脇肋虛脹噎 氣傷神或臨食憂感或事不隨意使鬱抑之氣留滞不 分心氣飲治男子婦人一切氣不和多因憂愁思應怒 八香不見火 去蓝炒各門冬少去草果仁 桑白皮 及炒各丁香皮

破去核及燈心十莝煎至七分去渣温服不拘時 右吹咀每服二錢水一盛入生薑三片康子 **氣吞酸口苦無味不思飲食婦人久患血氣刺** 命柏刀散治男子婦人 厚朴去粗皮 (方見後 一去白 捅胸脇逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不 白术 香附子妙去藿香半 う付うす **積冷中焦不和心下虛** 少半两紫絲 一雨 甘草 個學 兩

金露儿依 可忍者 欽定四庫全書 温 常服醒胖胃進飲食此藥大 右製净為細末每服二錢用鹽少許沸湯點不拘 糯米二五两 酒調猶佳 年林 内巢 1至黑色 10 王先 亢生 即豆 見方 去半 進天 **秋**↓ 巴兩 實治腹內積聚避塊久患 追问 炒 石档 解酒毒空心食前服或 上 取 班 雅 雅 雅 即去 不見 猫一番百 個 膨 十同 雨炒

欠モゴド 思飲食昏昏如夢不晓人事欲死惧多或歌或哭 紋結衝心及兩脇徹背連心痛氣不息氣統臍下 一般将 語無度人治小兒熊府婦人 ·咬不可忍又治十種水氣及胃吐食嘔逆飲食多 不調 ,漏臉氣走注風有似蟲行手! (病皆療更不細述 貝母 去心 太平息民和刻局方 人丘邪夢 紫苑到 辨其狀但服 判 焙 苗 (煩熱夜卧不安 主大 焙蘆

右為細末以類糊丸如梧桐子大每服五九小児两 張 思 置 湯下心痛酸石榴皮湯下口瘡家 桂心不見火 又一方用甘遂 草鳥頭蛇西

秘傳 當歸酒下如不飲酒當歸煎湯下亦得疝氣嵐氣小 肠氣及下墜附子湯下 白痢甘艸氧薑涉下胸膈噎問通草湯下婦人 結氣痞塞鶴膝並用鹽湯鹽酒下 米飲茶酒熟水任下傷冷腹痛酒食所傷酒疸黃疸 氣鴻煮陳皮飲下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯 Ì 上頭痛后骨湯葱茶下 1... 氣湯治男子婦, 太平忠民和副司方 常服及應疾急諸般疾患只 切牌氣橋皮湯下 一熱下虚之疾凡飲食過度 主 水鴻並 血氣

多克匹丹全書 喉乾噪飲食無味下弱則腰脚無力大便秘溫裏急後 使氣不升降上 致傷脾胃酒色無節耗損腎元水上交攻陰陽關隔遂 此藥却以所主藥治之無不效者 一焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不差宜先服 1臍股冷痛治以凉則脾氣怯弱腸鳴下痢治以温 桑白皮 一日炒炭半一 二炒两 **一热则頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快** 骨碎補炒 な皮枯ち 则 咽

木香分氣 当婦人 煎下部大段虚加少許炮附子煎如使附子多加生 **那調和榮衛通利三焦開膈化痰和五臟消痰嗽** 石為粗散和勺再就蒸 ī 二葉生薑三片水一盞同煎至七分食後通口服常 夏麴煎心肺虚加人参挨苓煎上膈熱加北黄芩 地骨皮 九治 血虚加當歸煎 一两 积殿社 1 切氣逆心胸滿問腹脇虚脹飲食不 **只平息** 土穣 伏時晒乾每服二錢紫熱 い列与す 去白 紫胡各两 加

消乾嘔 弘定四庫全書 鐵 惡心一切瘡痢氣疾腸風下血臟毒滑腸泄瀉 刷湯治男子脾積心氣痛婦人血氣刺痛及治中 不計時脾胃虚的人最宜服常服寬中順氣進食 **占為細末水糊為丸每服二十粒煎生薑橘皮湯下** 香附子 木香 十六两 苗香炒两 甘松各一两甘草 甘草八两半倉 進裁术 六两 あ 酒

燒 ・/・ / !!! /: とう 刺 ,脾散治脾胃虚弱久寒積冷心氣,脾痛冷痰 嚼下能治四時、 並用 薑三片 奏一 連進三服無治四方之人不伏水上小児臟寒脱 右為細末每服二錢薑三 分温服或熱酒調下亦得如脾寒用酒 若行路早起来一 嘔吐惡心不思飲食及療婦人 八節疫癘沙瘴等疾 枚煎服冒暑伏熱擦生薑冷水調 一枚去核包藥少許同生薑三片 太平息民和副司方 捻水 (血氣攻刺腹 盛臨發時 盏煎至 芫 翻胃 脇 臍

多庆四库全書 撮痛服之立效 曦逆 惡心頭疼煩渴倦怠嗜卧不思飲食 法半夏涉治脾胃不和中脫氣滞宿寒留飲停積了 右為細末 每服 心服剌痛脇肋膨脹嘔吐痰水噫氣吞酸中酒吐酒 丁香 去白 大錢白湯點下不拘時候 各炒四 两草 八二兩三 十油 煨去皮 两剉 两

次足四年全局 膈氣翻胃 味嘔熾惡心不思飲食面色萎黃腸虛自利肌體瘦弱 白术六乙湯治脾胃不和心腹痞悶脇肋腹脹口苦無 右為細末每服 右為細末每服二錢水 破痰開胃健脾消酒進食 白术六两 平夏麴炒二兩三錢 100 錢鹽湯點服不拘時候常服温平 太平息民和利局方 一盏煎至八分空心食前服 甘草溪 两 里

鹽煎散治男子婦人 氣形內外腎痛又治婦人血氣刺痛血積血瘕繞臍撮 霍亂轉筋臍腹冷疼泄瀉不止及膀胱成陣刺痛小腸 金グログノニー 痛並皆治之 時並宜服之 疼痛轉項拘急或脾胃虚冷不思飲食時發嘔吐 湯點服亦得常服育神温胃 又方見後 孝三 切冷氣攻衝胸脇及前後 八柳此出 /濕消痰不以四

灰色马平台町 神仙沉麝九治 **右件碾為細末每服:** 至八分空心食前服之 内豆蔻煨 没樂 瓜砂 八麥穿 研 两 炒 切氣痛不可忍者 木香半雨 沉香剉 茴香 枳殼 太平息民和刺母方 炒去獲 一錢水一登半入鹽 良薑油炒 血竭 甘草 二两 宿泔 泛 麝香研細 罕 甘草 字同於 上去皮

亂吐鴻胸胖心痛逆氣短氣中滿虚痞膈塞不通或 治 金がらんろうじ 病瘥後胷中有寒時加咳嗽並宜服之 中湯治脾胃不和飲食減少超氣虚贏而復嘔逆霍 止肯與牛凡往往亦搖神效不可盡述 氣痛不可忍者以一 血氣酷湯下松滋令萬君擬實此藥婦人庭後血崩 右為木熬甘草為膏沒和每服一九用薑鹽汤嚼 F 甘草 九立愈萬君神祕之每有人 病

結胸欲絕心膈高起實滿作痛手不得近 枳實理中九理中焦除痞滿逐痰飲止腹痛大治傷 熱服空心食前或霍亂後氣虚木禁熱樂者尤宜服之 右為粗木每服三錢水一益半煎至一中益去渣稍 右持羅為細末煉蜜為丸如雞子黃大每服 7 甘草 坐 183 白术 白茯苓去皮乾薑丸三两 太平惠民和利局方 人法士白 去廬 当十二 丸

者只 國兵匹丹在書 進食散治 前服 沉香散治一切冷氣攻 右為細末每服二錢水一大蓋生薑五片煎之分食 甘草谷一 服顿覺能食 連進二三刺服智山 人去很快橋皮 胃虚冷不思飲食及久病人 果肉 太三 去台 川烏頭此各河子四島良薑夢切肉桂 豁然不拘時 胖虚全不 五煨皮去 粗 粗

胸膈 **后為細末每服二大錢** 訶子肉 白薑炒 牌藏伏冷胃脫受寒智賜痞問心腹 煎七分食前服 乾山樂 去處各 服墜氣和牌胃 平見 くいりうか 丁香半 白茯苓 沉香 冽 翻胃吐 白术 附子 痛 四

雞舌香散治男子女人陰陽不和減腑虚弱 肢逆冷但是沉寒痼冷無問久新功效不可 銀定匹庫全書 煎至七分空心食前稍熱服查再煎病退即止極 右件剉為粗散每服二錢水一益生薑三片鹽 **飲停積不消胸膈脹端心脾引痛攻刺腹脇** 了不见火红豆, 人去 以限皮 益智五两半 去皮 一去白 乾薑 外四 青皮 一去白 再胡林 勒

欽定四庫全書 美飲食療一切冷物町傷並皆治之 並皆治之 妨飲食又治中酒吐酒停飲浸渍嘔逆惡心噫氣吞酸 二畫九養脾温胃去冷消痰大治心脾疼寬胸下氣進 右為細末每服二錢入鹽少 乾薑儿 香附子妙去赤片 良薑麻油炒肉桂去粗皮甘草 3 长年 息民和副局方 ·許用沸湯點服不拘時 天台鳥去木 去蓝頭 半兩 黑四

滑不禁入治胃脫停寒嘔逆在酸痞塞不通不思飲食 伤冷物泄漓汪下腹痛肠鸣或久痢純白時下青黑腸 **蕾合九治男子婦人氣血虚弱久積陰冷留滞不化結** 身體沉重面色萎黄或人患心脾痛服之水除根 聚成形心腹膨脹刺痛成陣上連胸脇或牌胃久虚內 九至二十九食後橘皮湯下妊娠婦人不宜服 右件等分為細末超糊為丸如梧桐子大每服十 香不見火木香不見火 各一两白术 焙

饭定四车全書 順氣木香散治氣不升 作合子安藥於內用温紙裹慢火煨 作二十九每服一九用老薑一 四 后件為細末入 去紙和薑細嚼白湯送下孕婦不得服小兒 服光 厚朴盖扑炙为豆蔻丸二两 去白 (小兒內有傷積服之無不神 Į. 八硼砂 太平惠民和副局方 降嘔逆惡心胸膈痞闷脇肋脹 錢薑汁殼打糊為九每 附子 , 塊如拇指頭大 去 一两半 一顿飯久 置 初開 取 吶 兩

湍 思飲食無療婦人血氣血刺痛及一 及酒食所傷吞酸心脾刺痛大便不調面黃肌瘦不 順氣和胃進食 分稍熱服不拘時或入鹽少許沸湯點服常服宽 **石热細末每服二錢水一盞薑三片棗:** 學朴蓋計民 又不見火縮砂仁 廿草 爁 陳皮 切冷氣並皆治之 米泔浸 一去白 孙 去蘆 当香炒两 肉桂 桔梗 一枚煎至 去廬 粗

女人 朋 股滿嘔吐酸水 牌夜 酒調 右件搖為細末每服二 我散治脾胃不和中 ブニニー 丰目店 切氣疾並宜服之 一来泔浸 去白 去白 平馬乙二月月月 **泄瀉臟腑不調飲食減少男子** 一錢入 へ鹽少 胃進飲食 尚香 囱桂 去粗皮 胸桔 去蘆

達煎丸治脾胃虚弱久有傷滯中脫氣痞心腹 多好四月全書 快氣涉治 下坚硬胃中 右為細木每服 痰逆嘔吐及宿酒不解 ,猶氣刺氣急及療食癥食酒癖血瘕氣塊時發疼 縮砂仁 胃或剉為粗未入生薑同煎名小降氣湯 切氣疾心腹脹滿胸膈噎塞噫氣吞酸胃 八两 痞寒噎氣不通嘔吐痰水不思飲食或 香附子 一錢用鹽湯點下常服快氣美食温 可恐飲食 两 甘草 服肠 爁

血氣不調小腹疼痛並皆治之 桐子大每服十几至十五九生薑湯下婦人淡酷湯 右件碾細莪术木入猪胰硼砂膏同醋糊為九如 嘔噦酸水面黄肌瘦精神困倦四肢少力又治女 猪胰 齿香 棟子去核山藥 以上二位同猪胰入硼砂熬膏 一县 炒 京三稜 附子於去改 硼砂 檳 莲我大片外 桺 未醋 各煮 炒去粮 四户 两透

身热不渴肠鸡自利米数不化 治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利心腹絞疼手足不和 飲食不下吃醋衣酸口苦失味怠惰嗜卧不思飲食又 欽定四庫全書 或飲酒過多胸脇逆滿噎塞不通嗽咳無時嘔吐冷痰 于 化痰飲 不計時候更量 金九理中焦不和脾胃積冷心下虚痞腹中 甘 虚臭加減常服順氣寬中 爁 平唐民未亦司方 箔水 米泔浸 桔梗 罩

灰定四車公島 图 並皆治之 **氣吞酸嘔逆惡心不思飲食或因酒過多傷脾胃不和** 集香凡治一切氣疾胸膈痛問脇肋脹滿心腹疼痛噫 飲食群風寒温冷 **黄肌內消瘦常服温牌煖胃留痰逐飲順三焦進呈** 九食前沸湯嚼下人治脾胃留濕體重節痛血色萎 石件各等分對為細末煉塞為九如弹子大每服 白豆蔻仁 縮砂仁 太平点民和利局方 木香不見火 童武和四 坚

異香散治肾氣不和腹脇膨脹症問噎塞喘滿不快 食難化噫氣私酸一切氣痞腹中刺痛此藥能破 常服寬中順無消宿酒進飲食磨積滞去濫塊 為凡如梧桐子大每服一二凡細嚼嚥津不拘時候 右件除研藥碾為細末入麝香拌匀用甘草膏搜和 "消宿冷沉積常服調五臟三焦和胃進食 八不见 大 格 煎膏 香附子 两去 鋖 麝香八錢

反己日年公言 图 **肉豆蔻丸治氣鴻** 皆可服 右件為細末每服二錢水一盞生薑三片來 **捻煎至七分通口服不計時候鹽湯點或鹽酒調** 甘草分六两厚朴片是一两限皮各三两青皮三两 肉豆蔻仁 訶黎勒皮 一两选我木 龍骨各三分赤石脂半两 解胃氣虚的飲食減少 太平忠民和利司方 白紫灰枯 京三稜地 木香三分 益智仁 党 7三炳

胃脾疼及食積氣塊攻剌腹脇不思飲食日漸羸瘦又 金グドルノラー 治年高氣弱三焦落寒 散治酒食所傷胸膈不快腸脇脹為嘔吐酸水翻 白茯苓四兩甘草 九米飲下不計時候 樂搗羅為末粟米飲和溲丸如梧桐子大每服 煨 益智仁 表三 三啊 爁 好問並宜服之 京三樣煨切青山 三去白各

如神九治 食和胃 許同煎至半盈温服不拘時候常服宽胸利膈消酒 **蝁鹽湯下一十丸至三十丸患鴻二宜湯下三十丸** 右等分為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服空心生 天南星此 京三 湯洗二七遍薑 計炒今乳 各三雨 切冷熱氣消解氣和胃調解温下元 羌活 附子处去皮脐 白芷 甘草

滿心腹 **欽定四庫全書** 香牌積九治丈夫婦人小児諸般食傷積聚胸馬脹 **涌並宜服之** 減與服白痢乾薑湯下 小兒赤痢甘草 兩煮 丁香 腿 二两 展噫氣吞酸宿食不化脾疼翻胃婦人血氣 木香各半两 橘皮湯下三丸至五丸量兒大小加 二两 良薑並乗热二 |本二||本三日本日日日日 r[D 髙良薑 7

甘草湯下丈夫小肠氣妙尚香酒下婦人血氣刺 量虚實加減如欲宣轉可加九數五史初冷氣清 積氣陳橋皮湯下口吐酸水淡薑湯下翻胃吐藿香 利三五行後以白粥補之孕婦不得服 淡醋湯下嘔逆為消湯下小光疳氣史君子湯下 每服五九七九至十五九二十九止食傷隨物下 百草霜三匙同碾為細末題糊為丸如麻仁 治證與前分心氣飲 同

欽定四庫全書 木香分氣丸治盜與前木香分氣九同 氣升降陰陽調順三焦和胖進食 右為粗未每服三錢水一盛生薑三片東二個灯心 五堃同煎至七分去渣温服不拘時候常服消化滞 青皮去白各紫蘇去粗 ,)去節 次洗七 秦白皮 做炒 赤芍藥 皮甘草 赤茯苓 八腹皮 根 縮砂 羌活兩 去狼 粗

反己口戶公言 化氣湯治 時候脾胃虚弱人量宜服之常服寬中順氣進飲食 终嘔吐酸水丈夫 甘 沉香 **大每服二十九至三十九生薑橘皮湯吞下** 香各四两 **** 味 就不見火搖羅為細末稀糊為丸如梧 -四两 切氣逆胸膈噎塞悶偏脹膨滿又治心 檀香 灌香葉 胡桃各一兩 木香 小肠氣婦人 太平息民和剧句方 甘松 川薑黄谷 八牌血氣 一场 縮砂去殼 兩 <u>+</u> 7

一氣上衝心腹堅滿肢體浮腫有妨飲 減食宿寒留飲停積不消肠下支結常 降氣湯治中脫不快心腹脹滿陰陽壅滞氣不升 金罗巴尼名言 右為細木每服二錢薑蘇鹽湯調下 茴香 塞喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中 炒 二粗 丁香 青门内 麸炒 去白 乾薑丸 陳皮 去粗 食 起去炒粮 婦人 **曼妨悶專治** 甘草 無味喝 淡醋湯下 及 路 四灸兩各 国

たこうしいか 肠胃虚滑或大病氣不復常飲食無味形容性 吐食心胸痞滿脇肋虚脹胃腹剌痛牽引持齊食少多 傷言微氣短口苦舌溫惡心嘔噦喜唾嚥酸久病泄痢 千金大卷牌九治脾胃虚弱停寒留飲膈氣噎塞翻胃 飲食 至七分去渣温服不构時候常服消痰飲散滞氣進 右為㕮咀每服二錢至三錢水一大益生薑三片煎 次去滑前胡去蘆洗 太千恵民和剧为方 各三两陳皮 去白 三两半

多方四月在書 三棱丸 盖智去数 积殼 山藥 茯苓去皮 苦梗炒 白术 胡椒 太三 縮砂去皮 陳皮去白 紅春 良薑 霍春去 使 克克

惡血不止臍腹疼痛應一切虚冷不思飲食並宜服之 胸膈殆問背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍 蟠忽散治男子婦人胖 胃虚冷攻築心腹連脇肋刺 血氣攻剌 進飲食 嚼白湯送下温酒亦得空心食前常服養益脾胃 石各等分為末煉蜜為丸如梧桐子大每服 ?筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及治婦 、地硬帶下赤白或然寒熱胎前產後

欽定四庫全書 不流行致頭面浮虚四肢腫漏心腹膨 皮散治男子婦人 右搖羅為末每服二 分空心食前稍熱服 縮砂 去皮 FQ 檳榔各四兩 牌氣停滞風濕客排牌 一錢水 泔浸 嫂 宿去 ĸ 益連根葱白一些煎七 机 肉桂 剂 梮 去白 去粗皮 各六 兩 狭 五古 令去皮者

腸鳴泄瀉嘔喊吐逆大宜服之 四君子湯治禁衛氣虛臟腑怯弱心腹 喘乏並皆治之 服之不构時侯切忌生冷油膩堅硬等物 **石為粗末毎服三錢水一盞半煎至八分去渣稍熱** 五茄皮 参去蓝 各等分 甘草 地骨皮 茯苓去皮 生薑皮 脹滿全不思食 白术 人分等!

欽定四庫全書 鹽煎般治盜與前鹽煎散同 **占為細末每服二錢水一盛煎至七分通口服不拘** 右細木每服二錢水一盞半入鹽一字煎至八分空 時入鹽少許白湯點亦得常服温和脾胃進益飲食 大去皮各缩砂 **太平良民和副司方** 橘紅十兩 去皮 尚看好各 五五

並宜服之 たこりはいい 痛及胃吐食口苦吞酸胃滿短氣肢體怠惰面色萎 心食前 不復常專受怯弱不能飲食及久病泄痢腸胃虚滑 苓肚脾丸治脾胃毒 縮砂 **惩痞不任攻擊 臓腑虚寒不受峻補或因病氣良** 好 去皮 乾薑 白术 **延弱胸膈滿問脇肋脹滿心腹** 平息民和制局方 挨苓去皮 奶 去

金为四四百言 嘔吐之病皆因三焦不調脾胃虚弱冷熱失和邪正相 嘔逆惡心腹脇脹痛短氣噎悶咳嘔痰水噫酷吞酸 脾胃進美飲食 白涉送下温酒亦得空心食前常服育神卷氣和補 清濁不分陰陽錯亂停痰留飲不能運化貿膈痞滿 右件等分為末煉蜜為丸如弹子大每服一丸細嚼 神麯 >香散治大人小兒嘔吐不己粥飲涉藥不下凡 山樂 白扁豆炒

てこりこ **眩重悄開食氣嘔吐煩悶顛倒不安四肢困弱不自勝** 多卧少 食並宜服之 内桂去和皮蓬木 白芍藥 兩炒 各四 起又治久病羸弱脾胃虚極中滿嘔逆全不 茯苓去皮 去蓝 太平泉文 妊娠阻病心中 香附炒 印制的方 乾薑 丸 ムナン 白术 木香 頭目

逆寒热往来或時汁出入治肠胃冷濕泄瀉注下水穀 宿寒留飲停積不消或因飲冷太過內傷脾氣嘔吐痰 **国贞正母全書** 不分腹中雷鸣脇肋虚筛魚糜傷寒陰盛四肢逆冷 人参煮散治脾胃不和中脫氣滯心腹脹痛不思飲食 空心食前温服小兒二歲可服半錢水五分生畫一 右為細末每服五錢水一益生薑三片同煎至七分 **片同煎四分已下温服更宜量歲数加減與之常服** 和脾胃進飲食 太三

東內平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹病利 痛口苦無味骨滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色姜黃 一體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自痢或發霍亂及 至七分食前空心服 右為細末每服二錢水一盛生薑 五片泰三個同煎 詹术去皮 四炳 一两竹樂 疒 斤 二两 丁香六两 甘堂

欽定四庫全書 虚氏異方感應丸與和劑方大不同但用修製領如法 五噎八痞骨氣反胃並宜服之 之氣 服調氣緩胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節 出焙燥碾為細木每服二錢用鹽湯點空心食前常 右件剉碎拌勺以水浸過面上半寸許煮令水乾取 生酱 陳橘皮去白 厚朴各五斤二两 紅聚各二斤倉木去粗皮米泔浸二 甘草 剉炒

腑 其功用妙處在用蠟之多切不可減常服建胖 醉能尤宜多服神效不可述 無寒熱瀉痢之疾盖消磨積滞以漸自然無疾遇 两最要匀停止是煖化不可偏勝此樂精婦 乳香 裹濕 十真两者 畏紙 分研 乾薑 杏仁 巴豆 霜節細 油透县 依十 巴個 豆去 易皮 去易皮 肉 豆塔规是表 油研油粉 盡用 成紙 華澄茄 白数 不動 霜重 為裹 过 炒 轧妙槌

欽定四庫全書 前四味棒和研与先將上項黃蠟十两於銀石點內 溶化作汁用重綿濾去造以無灰老酒一 不用春夏修合用清麻油一兩秋冬用油 器內煮蠟溶數滚取起候冷其蠟自浮於酒上去酒 和前項藥末十分均勻了候稍凝分作劑子用罐子 右除已豆粉百草霜杏仁乳香外余並為細末却 銀紀內熬令香熱次下酒煮蠟同化作汁 檳榔 两 N. 連民本者及法 升於銀石 五六 一两半

欧定四車全書 腹脇走注刺痛及喘急痰嗽面目虚浮四肢腫滿大 秘結水道赤澀又治爱思太過怔忪鬱積腳氣風熱緊 治諸氣痞滞不通骨膈膨脹口苦喉乾嘔吐少 **木香流氣飲調順榮衛通流血脉快利三焦安和五** 不拘時候 **九然九子愈細其功愈博臨睡須常服之若欲治病** 十九加至五十九無處此藥以藥蠟多雖難 月後方可服如服旋丸如蘿蔔子大 Į 太平忠民和朝昌方 车 入任意 食有特

石粗木每四錢水盞半薑三片來 白芷 甘草 喘痛脹急 次二兩人湯洗七 不見火 見粗 陳 香附 草果仁 石菖蒲 八去節 白水 煨 去白 to

大定の車をき 使 陽之氣鬱結不消諸熱縊毒腫痛結核或似癰癤而 五香散升降諸氣宣利三焦)與導壅滞發散邪熱治陰 陰陽汁出立愈臟腑自利入粳米煎婦 熱服如復寒頭痛緩得即人 文醋煎並不拘時 藿香 頭痛惡心寒熱氣急 不香 W 丁香 太平息民和利的方方 沉香 連根慈白三寸煎升 乳香 至 血氣瘤瘦 非

滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噎問 ヨジロスノコミ 食後温服 右為末每服 麥木香湯順氣寬中治胸膈痞塞心腹刺痛脇肋脹 右等分為粗末每服三錢水一 木香不见火 甘草 丁沉透膈湯治脾胃不和中寒上氣脇肋脹 剉炒 錢沸湯點服不計時候 四刷斤洗 卷三 公三斤麥縣、 鹽 一盏半煎至八分去渣 十妙 切氣疾並皆治之 去土炒薑首介 斤 一各五 淌

とこの日から 塞不通噫氣吞酸口苦失味並皆治之 右吹咀每四錢水二大盏薑三片來 白术二两 沉香 厚朴处妙各 木香 丁香 痛痰逆惡心或時嘔吐飲食減少十膈五噎 ¥ 香附炒 麥蘇 太平息民和副局方 各半 各七錢半 一钱半神 **为豆蔻**煨 縮砂仁 甘草 兩 半灌香 個煎至八分 卒 白豆蔻

廿四味流氣飲方與木香流氣飲方同但無石菖蒲藿 金万里尼 有一 调 香有沉香枳殼大 選大腸 香檳檳九珠草三焦寬利胸 云渣熱服 木香不見火 郁孝仁 一去皮皂角 與前蘇合香丸方同只去腦子 黄麵裏 木三 酷去 由 炙皮 膈破 青皮 麵殼 去 切去 稂 白 枳殼 集四 消食 炒

欠己の日という 服生薑湯下 右為細末別用皂角四兩用漿水 热蜜少許和九如梧桐子大每服五十九食後 1 太平息民和别局方 碗搓操熬 갹

太平惠民和劑局方卷三